

風しんの定期予防接種を希望する方へ

2019年度、40歳以上57歳以下の年齢にあたる男性の方

接種対象者

次の年齢の男性で、抗体検査の結果「陰性」の方は、風しんワクチンまたは麻しん風しん混合(MR)ワクチンの定期接種を受けることができます(1回0.5mL、皮下接種)。

- 1962年(昭和37年)4月2日生まれ
～1979年(昭和54年)4月1日生まれ



年齢早見表(2019年版) ※誕生日前は下記の表から1歳引いた年齢となります。

生年・西暦	生年・和暦	干支	年齢
1959年	昭和34年	亥年	60歳
1960年	昭和35年	子年	59歳
1961年	昭和36年	丑年	58歳
1962年	昭和37年	寅年	57歳
1963年	昭和38年	卯年	56歳
1964年	昭和39年	辰年	55歳
1965年	昭和40年	巳年	54歳
1966年	昭和41年	午年	53歳
1967年	昭和42年	未年	52歳
1968年	昭和43年	申年	51歳
1969年	昭和44年	酉年	50歳
1970年	昭和45年	戌年	49歳
1971年	昭和46年	亥年	48歳
1972年	昭和47年	子年	47歳
1973年	昭和48年	丑年	46歳
1974年	昭和49年	寅年	45歳
1975年	昭和50年	卯年	44歳
1976年	昭和51年	辰年	43歳
1977年	昭和52年	巳年	42歳
1978年	昭和53年	午年	41歳
1979年	昭和54年	未年	40歳
1980年	昭和55年	申年	39歳
1981年	昭和56年	酉年	38歳
1982年	昭和57年	戌年	37歳

厚生労働省健康局：昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を対象に実施する風しんの抗体検査及び予防接種法第5条第1項の規定に基づく風しんの第5期の定期接種の実施に向けた手引き(第1版)2019年2月8日 <https://www.mhlw.go.jp/content/000477973.pdf>

2019年に始まるこの制度は2022年3月31日に終了する予定です。なお、自治体により事業の開始時期や対応が異なるため、詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

女性及び接種対象者に該当しない年齢の男性(39歳以下および58歳以上)は、任意接種として風しんワクチンまたは麻しん風しん混合(MR)ワクチンの接種を受けることができます。

麻しん風しん混合(MR)ワクチンについて

- ・麻しんウイルス及び風しんウイルスの毒性を弱めたワクチンです(生ワクチン)。
- ・1回の接種で、麻しんと風しんの両方の免疫を獲得することができます。
- ・子どもたちが麻しん及び風しんの抗体を獲得するために、1歳児と幼稚園または保育園の年長児(5歳以上7歳未満)を対象に、2005年から2回の定期接種に使用されているワクチンです。
- ・主な副反応は、発熱と発疹です。また、ショック、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、急性散在性脳脊髄炎、脳炎・脳症、けいれんなどが報告されています。

※このワクチンは、妊娠している女性には接種できません。